

ছাগলীৰ বেমাৰ - আজাৰ আৰু প্ৰতিকাৰ



- ◆ গাভীনী ছাগলীয়ে বিনোশ পোলাৰ পাৰে।
- ◆ ৫-১০ দিনমান ওপৰৰ লক্ষণসমূহত ভোগাৰ অন্তত ছাগলী জনীয়ে মৃত্যু বৰণ কৰিব পাৰে।

চিকিৎসা:

- ❖ এই বেমাৰৰ পৰা আৰোগ্য হোৱাৰ প্ৰত্যক্ষ ঔষধ নাই যদিও যিকোনো বহল পৰিসৰৰ প্ৰতিজৈৱিক বেজী দিব পাৰি। জ্বৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে পেৰাচিটামল বেজী দিব লাগে।
- ❖ নাটকোফ নামৰ পনীয়া ঔষধ খুৱাব লাগে।
- ❖ বেকনৰ নামৰ টেবলেট খুৱাব লাগে।

প্ৰতিকাৰ:

- ◆ আশ্ৰয় ছাগলীবোৰ ততাতৈয়াকৈ সুস্থ ছাগলীবোৰৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব লাগে।
- ◆ যিহেতু এই ৰোগৰ মৃত্যুৰ হাৰ অতিশয় বেছি আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতেই মৃত্যু হয় সেয়েহে প্ৰতিৰোধেই উত্তম উপায়।
- ◆ PPR নামৰ ছিটা এবিধ প্ৰতি তিনি বছৰৰ ব্যৱধানত দিয়ালে ছাগলীৰ জাতটো এই বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা পৰে। আজি-কালি এইবিধ টিটা পশু চিকিৎসালয়ত উপলব্ধ কৰোৱা হৈছে।

ছিটাকৰণ আৰু পেলুৰ ঔষধ খুৱাব নিৰ্দ্ধাৰিত সময়সূচী

বেমাৰৰ নাম	ছিটাকৰণ সময়	ছাগলীৰ বয়স	মন্তব্য
পেটফুলনা বেমাৰ বা এণ্টেৰট ক্ৰিমিয়া	মাৰ্চ /এপ্ৰিল আৰু ছেপ্তেম্বৰ/অক্টোবৰ	প্ৰথমবাৰ ২-৩ মাহ বয়সত	প্ৰতি ছমাহৰ মূৰে মূৰে দি থাকিব লাগে
পি. পি. আৰ. (PPR)	ফেব্ৰুৱাৰী-মাৰ্চ	প্ৰথমবাৰ ২-৩ মাহ বয়সত	প্ৰতি তিনি বছৰৰ ব্যৱধানত পুনৰ দিয়া হয়
পেলুৰ ঔষধৰ নাম	খুৱাৰ সময়	ছাগলীৰ বয়স	মন্তব্য
এলেনেডাজল	মাৰ্চ-এপ্ৰিল আৰু ছেপ্তেম্বৰ-অক্টোবৰ	প্ৰথম বাঁহ খোৱাৰ ২৫-৩০ দিনত	প্ৰতি মাহে মাহে তিনিমাহলৈ আৰু তাৰ পিছত ছমাহৰ মূৰে মূৰে খুৱাব লাগে
ফেনেনেডাজল বা প্ৰাজিকোৱাৰ্টেল	ই	৩ মাহ বয়সত	প্ৰতি ছমাহৰ মূৰে মূৰে খুৱাব লাগে

মুখ্য গৱেষক, সৰ্বভাৰতীয় সমন্বিত ছাগলী গৱেষণা প্ৰকল্প, ছাগলী গৱেষণা কেন্দ্ৰ, অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাণীহাট - ৭৯৩৩০১ ৰ স্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু মাইক্ৰ কম্প'উট, হুৱাইল, গুৱাহাটীৰ দ্বাৰা মুদ্ৰিত। সন্নিবেশ তথ্যৰ বাবে যোগাযোগ কৰক: ৯৮৭১৬৫৩২৪৭৭

প্ৰস্তুত কৰোতা :

ড° নৰ নাহৰভেকা

ড° আৰুচ ঢালেক

ড° কামি গগৈ শৰ্মা

ড° অক্ষুৰ দাস

ড° জয় প্ৰকাশ শৰ্মা

সৰ্বভাৰতীয় সমন্বিত ছাগলী উন্নয়ন প্ৰকল্প

ছাগলী গৱেষণা কেন্দ্ৰ, অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

বাণীহাট, কামৰূপ, অসম



গৱেষণা সঞ্চালকালয় (পশুচিকিৎসা)

অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, খানাপাৰা

গুৱাহাটী - ৭৮১০২২