


BODY CONFORMATION



POINTED WITHERS




- POINTED OR SHARP WITHERS
- NOT DESIRABLE IN MEAT GOATS
 - INDICATES LACK OF WIDTH THROUGHOUT




- NORMAL ROUNDED WITHERS
- INDICATES WIDTH THROUGHOUT
 - IS ACCEPTABLE
 - NOT DESIRABLE IN DAIRY GOATS

DROOPING RUMP



- NORMAL RUMP HAS SLIGHT DROP. ALSO INDICATES SPRING ACTION. SLIGHT DROP IS DESIRABLE.



- EXCESSIVE DROP IN RUMP INDICATES STRUCTURAL UNSOUNDNESS AND IS NOT DESIRABLE.

തയ്യാറാക്കിയത്

ഡോ. ബിമൽ. പി. ബഷീർ, എസ്.ആർ.എഫ്

ഡോ. തിരുപ്പതി വെങ്കിടാചലപതി, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ & ഹെഡ്

**സെന്റർ ഫോർ ആൻഡ് വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ആനിമൽ ജനറ്റിക്സ്
ആൻഡ് ബ്രീഡിങ്ങ്, കോളേജ് ഓഫ് വെട്ട് ആൻഡ് അനിമൽ
സയൻസസ് മണ്ണുത്തി, ത്രിശൂർ, കേരളം 680 651**

Email: goatandsheepf@kvasu.ac.in

കേരള വെറ്ററിനറി & ആനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി

വളർത്തുവാൻ ആടുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി



യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗോട്ട് & ഷീപ്പ് ഫാം മണ്ണുത്തി 680 651



എ. ഐ. സി. ആർ. പി. ഓൺ ഗോട്ട് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് (മലബാറി), കോളേജ് ഓഫ് വെറ്ററിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസസ് മണ്ണുത്തി, ത്രിശൂർ, കേരളം 680 651



വളർത്തുവാൻ ആടുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി


പെണ്ണാട്

- 2-3 കിടാക്കളുള്ള തള്ളയിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കണം.
- 6-9 മാസത്തിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകണം.
- തള്ളയുടെ പാലുല്പാദനശേഷിക്ക് പരിഗണന നൽകണം.


ആണാട്

- വീതിയേറിയ നെഞ്ച്, ഉയരമുള്ള നീണ്ട ശരീരം.
- 9-12 മാസത്തിൽ പ്രായപൂർത്തിയെത്തുന്നു.
- 6 മാസത്തിൽ നല്ല തൂക്കമുള്ള കിടാക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
- 2-3 കിടാക്കളുള്ള തള്ളയിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കണം. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില ശാരീരികമായ പ്രത്യേകതകൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 'ഐഡിയൽ' അല്ലാത്ത ശാരീരികഘടന ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

Front - view examination



Rear legs



Front legs

